

Grand groupe : Surirellacées



Code Omnidia retenu : **SANG**

Code SANDRE : **8483**

Publications :


Hofmann et al. 2011
Potapova & English 2010
Siver et al. 2005
Krammer & Lange-Bertalot 1988
Fabri & Leclercq 1984
Helmcke & Krieger 1953
Kützing 1844

***Surirella angusta* Kützing 1844**

Basionyme :

Synonyme :

Surirella ovalis var. *angusta* (Kützing) Van Heurck 1885
Surirella ovata var. *angusta* (Kützing) Cleve-Euler 1952
Suriraya ovalis var. *angusta* (Kützing) Gutwinski 1899



Ecologie : Source bibliographique : Van Dam et al. 1994

Sensibilité IPS : 4,0

Valeur Indicatrice IPS : 1,0

Taxon présent dans les eaux douces à légèrement saumâtres, sensible à la charge organique (bêta-mésosaprobe) mais résistant à la charge minérale (eutrophe).

Informations espèce

Surirella minuta et *S. suecica* possèdent des valves hétéropolaires.
S. amphioxys présente des ondulations sur la face valvaire.

Caractéristiques morphologiques :

Source bibliographique : Hofmann et al. 2011

Mesures en Ile de France (Nbre de mesures : 29)

Longueur : 18-70 µm

Largeur : 6-15 µm

Longueur : 24,9-53,9 µm

Largeur : 8,0-13,2 µm

Nombre de stries : 20-28 stries/10 µm

Nombre de fibules : 5,5-8 fibules/10 µm

Nombre de stries : non mesuré

Nombre de fibules : 6-8 fibules/10 µm

Nombre d'ondulations : non renseigné

Nombre d'ondulations : non mesuré

