

**Grand groupe :
Surirellacées**



Code Omnidia retenu : SLAC

Code SANDRE :

Publications :

English & Potapova 2012

Surirella lacrimula English 2012

Basionyme :

Synonyme :



Ecologie : Source bibliographique :

Sensibilité IPS :

Valeur Indicatrice IPS :

Informations espèce

Jusqu'à présent, dans les inventaires de la DRIEE, le taxon *Surirella lacrimula* était identifié et comptabilisé en *S. brebissonii*.
S. brebissonii possède une densité de stries inférieure (16-20 stries/10 µm).
S. minuta a des valves avec une gamme de longueur plus étendue (9-47 µm) et un "pied" moins pointu.

Caractéristiques morphologiques :

Source bibliographique : English & Potapova 2012

Mesures en Ile de France (Nbre de mesures : 40)

Longueur : 19-30 µm

Largeur : 10-13 µm

Nombre de stries : 27-33 stries/10 µm

Nombre de fibules : 6-8 fibules/10 µm

Nombre d'ondulations : non renseigné

Longueur : 17,6-25,5 µm

Largeur : 9,2-11,6 µm

Nombre de stries : 26-32 stries/10 µm

Nombre de fibules : 6-8 fibules/10 µm

Nombre d'ondulations : non mesuré

